

第十課 盆栽技術淺談之分株

分株繁殖法簡介：適用植物類型、基本程序、注意事項

分株法是無性繁殖的一種方法，適用於一些沒有主幹，叢生的多年生草本植物、灌木和宿根花卉，例如：文竹、吊蘭、袖珍椰子、萬年青、蘭花、美人蕉、鳶尾、水仙、風信子、鬱金香、大麗花。因為這些植物的新芽是從植物底部或走莖上生長出來，只要新芽長根，你就可以將幼苗從母株切出來，成活率是非常高的。

分株繁殖的時間要看植物品種，如果是觀花植物，春季開花的宜在秋季分株，秋季開花的宜在春季分株。其他觀葉植物就以春秋為主，但以春天換盆時一起做為多。分株前的一兩天最好停止澆水，讓土壤稍乾，容易脫盆和將泥土鬆開，根部也不會那麼容易折斷。

例子：袖珍椰子分株

袖珍椰子的繁殖可用播種或分株法，播種時間會較長，分株較快。最適宜分株是在初春。分株的基本步驟包括：

1. 按按花盆四周讓泥土鬆脫，將花盆倒轉，一手拿著植物，一手拍拍盆底，將整個花盆脫出來。
2. 用手鬆脫底部泥土至看到根部，看看根的分佈再決定如何切開或用手分開，檢查有沒有爛根要清除或修剪。
3. 準備兩個 3 吋半直徑種植盆，放入紗網遮蓋盆底孔，再放適量含有機物的培植土至半滿位置。微微澆水至泥土微濕。
4. 將分離出來的植株放進盆中央，回填種植土至盆頸位，放在底碟上，再澆透水至盆底流出來為止。重複做第二盆。
5. 將盆栽放在陰涼處護養，不要陽光直射，也不要施肥。一兩週之後可以放在室內明亮處護養，定時澆水。



袖珍椰子春至夏季為生長旺盛期，需要較多水，保持泥土濕潤，排水良好，也可定時每月施薄肥。當秋冬空氣乾燥時，可經常對葉面噴霧以提高空氣濕度。溫度低的時候停止施肥，減少澆水量。袖珍椰子是半陰室內植物，強烈陽光會令葉變黃或枯乾起褐色斑點。當看到根部擠滿花盆時就是換盆的時候。